

Zur Weiterleitung
an den Hausarzt oder
behandelnden Gynäkologen



Dr. med. Sylke Reichel-Fentz
Fachärztin für Transfusionsmedizin

Tel: 06221/75 23 981 Fax: 06221/7523376
kinderwunsch@synlab.de; www.immu-baby.de

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre o.g. Patientin ist seit _____ Jahren in Kinderwunschbehandlung. Bislang bleiben leider alle Bemühungen für eine erfolgreiche Schwangerschaft erfolglos. Immer wieder fiel als immunologischer Risikofaktor eine teilweise deutlich erhöhter Anteil von natürlichen Killerzellen auf. Auch Unterstützungsmaßnahmen mit Granocyte, IVIG, Prednisolon, Trental und Granocyte haben nicht zu einer erfolgreichen Schwangerschaft geführt, auch wenn dafür sicher die Bedingungen des letzten IVF/ICSI-Zyklus mit verantwortlich sind.

Eine weitere Maßnahme die Aktivität der NK-Zellen zu senken, ist die Behandlung mit Intralipid. Diese Behandlung sollte optimaler Weise schon ca. 2 Monate im Vorfeld des erneuten IVF/ICSI-Zyklus begonnen werden.

Zur Infusion werden 100ml Intralipid 20% in 500ml physiologischer NaCl-Lösung verdünnt und über einen Zeitraum von ca. 1,5 bis 2 Stunden infundiert. Zwischen den Infusionen sollten ca. 2,5 bis 3 Wochen liegen. Die „letzte“ Infusion sollte ca. 1 Woche vor dem Transfer erfolgen.

Bei einem positiven Schwangerschaftstest kann dann nach dem aktuellen Immunstatus entschieden werden, ob und ggf. wann weitere Infusionen erforderlich sind.

Aufgrund des weiten Anfahrtsweges kann ich die Infusionen bei der Patientin leider nicht selbst durchführen. Ich möchte Sie deshalb höflichst bitten, die Behandlung bei Fr _____ durchzuführen. Intralipid wurde der Patientin von mir bereits auf Privatrezept verordnet.

Mit freundlichen Grüßen
